



ROSA DUMETORUM.

R. ramis glabris; aculeis infra folia geminatis, validis, uncinatis; foliis pubescentibus; petiolo minute passim aculeato; foliolis sub-orbiculato-ovalibus 5-7; fructibus globosis pedunculisque glabris.
Th. Fl. de Paris, éd. 2, p. 250. DC. Fl. franç. éd. 3, vol. 6, p. 554. Art. Hort. Kew. epit. of the 2^e ed. add. p. 373. SMITH, Engl. Bot. Tab. 2579. RAU, En. Ros. p. 85.

R. (Canina) var. δ. POIR. Ency. 6, p. 288.

R. (Canina) var. γ. DC. l. c. vol. 4, 3716.

R. (Canina) var. B. BAST. Fl. M. et L. p. 189.

R. (Arvensis.) WIBEL, Fl. Werth. p. 263.

R. (Collina.) WALLR. Ann. bot. p. 67. *Exclusis synonymis ple-risque.* (Ex RAU, l. c.)

R. (Collina dumetorum.) RED. Roses, vol. 2, p. 14, var. ζ.

LE ROSIER DES BUISSONS.

DESCRIPTION.

Arbrisseau assez commun dans les bois et dans les haies aux environs de Paris. On le trouve aussi dans les contrées septentrionales de l'Europe. Il s'élève, en un buisson rameux, à la hauteur de trois, de quatre, et souvent de six pieds. Ses rameaux, absolument glabres, sont armés d'aiguillons crochus, quelques-uns épars, mais presque toujours disposés deux par deux près des stipules. Les feuilles se composent de cinq, plus rarement de sept folioles ovales-arrondies, vertes et glabres en-dessus, plus pâles et tomenteuses en-dessous, en général